


# Recuerde medir el perímetro cefálico al nacer y a las 24 horas de nacido



- Use una cinta métrica que no se pueda estirar.
- Ajuste la cinta métrica firmemente a la parte más ancha posible de la circunferencia de la cabeza:
  - la parte más ancha de la frente arriba de las cejas y las orejas, y
  - la parte más prominente de la parte de atrás de la cabeza.
- Tome la medida tres veces y seleccione la medida más grande. Si fuera necesario, aproxime al milímetro (0.1) más cercano y registre siempre un decimal.
- Mida el perímetro cefálico al nacer y a las 24 horas del nacimiento. Anótelos en el expediente.

Fuente: Medición del perímetro cefálico, CDC, 2016


## Tabla de valores de microcefalia en recién nacidos de 37 semanas o más (OMS)

Clasifique MICROCEFALIA con un valor <u>por debajo de:</u>	NIÑAS	NIÑOS
- 2 Desviaciones Estándar (DE)	31.5 cm	31.9 cm

Si conoce la edad gestacional con precisión puede utilizar los estándares de INTERGROWTH-21 según sexo y edad gestacional (véalos atrás). Hay estándares de INTERGROWTH-21 para recién nacidos(as) prematuros(as).

Fuente: OMS/OPS Lineamientos preliminares de vigilancia de microcefalia en recién nacidos en entornos con riesgo de circulación de virus Zika. Washington, D.C., 2016.

## Curvas Internacionales de Referencia de Tamaño de Recién Nacidas Perímetro Cefálico



## Curvas Internacionales de Referencia de Tamaño de Recién Nacidos Perímetro Cefálico

