

EL ZIKA Y LA TRANSMISIÓN SEXUAL



QUÉ SABEMOS Y QUÉ NO SABEMOS.



Qué sabemos

- Un hombre infectado con zika puede transmitir el virus del Zika a sus parejas durante una relación sexual. Esto incluye sexo vaginal, anal y oral (boca a pene).
- En los casos conocidos de transmisión sexual, los hombres tenían síntomas de zika. A partir de estos casos, sabemos que el virus puede transmitirse cuando el hombre presenta síntomas, antes de la aparición de los síntomas y después de que estos desaparecen.
- El virus puede permanecer en el semen durante más tiempo que en la sangre.



Qué no sabemos



- Por cuánto tiempo puede permanecer el virus del Zika en el semen del hombre infectado o diseminarse a través de las relaciones sexuales.
- Si los hombres que padecieron el zika y nunca presentaron síntomas pueden tener el virus en el semen o transmitirlo a través de las relaciones sexuales.
- Si una mujer puede transmitir el virus del Zika a sus parejas sexuales.

¿Está embarazada?

Lo que debe saber acerca del zika y las relaciones sexuales.

Un hombre puede transmitir el virus del Zika por vía sexual a sus parejas. Como el zika puede causar ciertos defectos congénitos, tome medidas para prevenir la infección durante el embarazo.



Si tiene una pareja de sexo masculino que vive en un área afectada por el zika o que ha viajado a un área afectada, debe proteger su embarazo.

Siempre que tenga relaciones sexuales vaginales, anales u orales (boca a pene) durante su embarazo, use condón correctamente en cada ocasión.



No mantenga relaciones sexuales con su pareja de sexo masculino durante el embarazo.

Si piensa que su pareja de sexo masculino puede tener o ha tenido zika, informe a su médico o proveedor de atención médica lo siguiente:

- Su historial de viajes
- Si tomó medidas para evitar las picaduras de mosquitos
- Cuánto tiempo permaneció él en un área con zika
- Si tuvo sexo con usted sin protección



Hombres: ¿su pareja está embarazada?

Un hombre infectado con zika puede transmitir el virus del Zika a sus parejas. Como el zika puede causar ciertos defectos congénitos, tome medidas para evitar que su pareja se infecte con el zika durante su embarazo.



Si vive en un área afectada por el zika, o viaja a una de estas áreas, proteja la salud de su compañera embarazada.

Siempre que tenga relaciones sexuales vaginales, anales u orales (boca a pene) durante el embarazo use condón.



Evite tener relaciones sexuales con su pareja mientras esté embarazada.

Si cree que puede tener o que tuvo zika, infórmele a su médico o proveedor de atención médica lo siguiente:

- Su historial de viajes
- Si tomó medidas para evitar las picaduras de mosquitos
- Cuánto tiempo permaneció en un área con zika
- Si tuvo sexo con usted sin protección



U.S. Department of Health and Human Services
Centers for Disease Control and Prevention

Más información disponible en:
www.cdc.gov/zika