



Seminario web el sobre Método Canguro en América Latina

Por iniciativa del proyecto ASSIST de USAID -ejecutado por University Research Company (URC)- y en asociación con la Fundación Canguro y la Alianza Neonatal, el martes 22 de abril de 2014, se desarrolló el seminario web ***“Perspectivas para la expansión del Método Canguro en América Latina: de dónde venimos, en dónde estamos y a dónde vamos”***.

Este evento, enmarcado en los procesos de gestión del conocimiento que desarrolla el proyecto, contó con la presentación de la Dra. Nathalie Charpak, pediatra del Programa Canguro del Hospital Universitario San Ignacio de Bogotá, quien a su vez es fundadora, investigadora y directora de la Fundación Canguro de Colombia. La moderación del evento estuvo a cargo del Dr. Jorge Hermida, médico salubrista, director del Proyecto ASSIST y de los programas de URC-CHS en América Latina.

El seminario permitió que debatan sobre el Método Canguro más de 50 profesionales de la salud materna y neonatal que realizan su práctica en ministerios, unidades de salud, instituciones de cooperación internacional y organizaciones de salud de 10 países del continente.

La Dra. Charpak, experta latinoamericana y mundial, expresó que el Método Canguro, dirigido a apoyar a prematuros de bajo peso al nacer, empezó a implementarse en América Latina hace 36 años con entusiasmo, sin embargo todavía no se ha logrado su expansión e implementación a gran escala en la mayoría de países, a pesar de la amplia evidencia científica a favor de sus ventajas sobre la salud del recién nacido que lo requiera.

En el mundo nacen cada año 18 millones de niños prematuros y mueren 4 millones en su primer mes de vida, la mitad de estas muertes están relacionadas con la prematurez y el bajo peso al nacer, señaló la Dra. Charpak.

Ante este panorama, el Método Canguro es una alternativa científicamente probada. En 2011 la Colaboración Cochrane publicó una revisión sistemática actualizada en la que se incluyeron estudios que evaluaban mortalidad al egreso hospitalario y alas 40-41semanas. Estos estudios reportaron una **reducción estadísticamente significativa en la mortalidad de los niños que recibieron el MMC, comparado con los niños que recibieron cuidados tradicionales**. La revisión concluyó que hay **suficiente evidencia** para recomendar el uso del MMC en niños estabilizados en el hospital.

La presentación de la Dra. Charpak se encuentra disponible en la página web Salud Materno Infantil www.maternoinfantil.org, donde se alberga la Comunidad de Práctica Canguro. Ubíquela en el siguiente enlace: http://www.maternoinfantil.org/comunidades_de_practica/archivos/Presentacion_Dra_Charpak.pdf

Persona de contacto. Dr. Jorge Hermida (jhermida@urc-chs.com)